

zur Verbesserung Ihrer Beschwerden ...

Bitte messen Sie in nächster Zeit täglich ihr Gewicht und ihren Blutdruck. Das Wiegen sollte nach dem morgendlichen Aufstehen ohne Kleidung und vor dem Frühstück erfolgen. Ihre tägliche Flüssigkeitsaufnahme (Getränke und Suppen usw) sollte nicht mehr als 1,5-1,8 l sein. Falls Ihr Gewicht innerhalb von zwei Tagen um mehr als 2 kg ansteigt, dann verdoppeln Sie bitte die Dosis ihres Diuretikums („Wassertablette – Torasemid oder Furosemid/Lasix). Ist das Ziel-Gewicht wieder erreicht, können Sie die Wassertablette wieder auf die ursprüngliche Dosis senken. Ihr Ziel-Gewicht empfiehlt Ihnen Ihr behandelnder Kardiologe der F13.

Bitte zweimal tgl. Blutdruck messen und eintragen.

Dr. med. Anton Hahnefeld
Dr. med. Michael Weber
Dr. med. Jochen Menne
Dr. med. Carla Edeling
Dr. med. Max Nagengast
Dr. med. Barbara Neugebauer
Innere Medizin, Kardiologie

Bernd Uwe König
Dr. med. Georg Herman
Innere Medizin, Angiologie
Frölichstr. 13, 86150 Augsburg

[illegible]

[illegible]

