

Vorbereitung auf Ihre Behandlung

Elektrische Kardioversion und/oder transösophageale Echokardiografie (TEE / „Schluckecho“)

Vor dem Eingriff

- Bis 4 Stunden vor dem Termin dürfen Sie ein leichtes Frühstück zu sich nehmen, danach bitte nüchtern bleiben.
- Klare Flüssigkeiten (Wasser, Tee ohne Milch, klare Säfte) sind bis 2 Stunden vor dem Termin erlaubt.
- Alle Medikamente, auch blutverdünnende Mittel (ASS, Eliquis, Xarelto, Lixiana, Marcumar), bitte wie gewohnt einnehmen.

Dr. med. Stefan Beil
Dr. med. Anton Hahnefeld
Dr. med. Michael Weber
Dr. med. Jochen Menne
Dr. med. Carla Edeling
Dr. med. Max Nagengast
Dr. med. Barbara Neugebauer
Innere Medizin, Kardiologie
Bernd Uwe König
Dr. med. Georg Herman
Innere Medizin, Angiologie
Frölichstr. 13, 86150 Augsburg

Ankunft in der Praxis (nur bei geplanter Kardioversion, nicht bei ausschließlich TEE)

- Bitte kommen Sie 30 Minuten vor Ihrem Termin in unsere Praxis (Frölichstraße 13, 3. Obergeschoss).
- Melden Sie sich an und sagen Sie, dass vor der Kardioversion ein EKG geschrieben werden soll.
- Wenn mehrere Patienten vor Ihnen warten, dürfen Sie sich freundlich vordrängen, damit das EKG rechtzeitig erfolgen kann.
- Bitte bringen Sie Ihre Versicherungskarte mit.

Ihr EKG wird einem Arzt gezeigt, der prüft, ob die Rhythmusstörung noch besteht (sie kann sich gelegentlich spontan normalisieren).

Wegbeschreibung zum Herz- und Gefäßzentrum (HGZ)

- vom Ärztehaus aus Im Erdgeschoss neben der Apotheke hinausgehen (nicht Richtung Straße)
- Der Haupteingang des Diako liegt schräg rechts gegenüber
- In der Empfangshalle rechts halten, kleine Treppe hinauf
- Ca. 30 m geradeaus an der Patientenanmeldung vorbei zum Aufzug
- In den 1. Stock, dann rechts zum Herz- und Gefäßzentrum (HGZ) folgen

An der Anmeldung des HGZ werden Sie bereits erwartet, alle Unterlagen liegen dort bereits vor.

Nach der Behandlung

- Sie bleiben zunächst zur Überwachung im Herz- und Gefäßzentrum.
- Danach kommen Sie zur Abschlussuntersuchung und EKG-Kontrolle wieder in unsere Praxis.
- Anschließend können Sie nach Hause gehen.
- Bitte führen Sie an diesem Tag kein Kraftfahrzeug (Medikamente beeinträchtigen die Reaktionsfähigkeit). Lassen Sie sich am besten abholen.
- Sobald die Betäubung im Rachen nachgelassen hat (nach ca. 30–60 Minuten), dürfen Sie wieder essen und trinken. Vorher besteht Gefahr des Verschluckens!